

Na Rođenju	BCG		Hep B				Porodilište
1. mesec			Hep B				Dom zdravlja
2. mesec		HiB		DTP	OPV		Dom zdravlja
3,5 meseca		HiB		DTP	OPV		Dom zdravlja
5. mesec		HiB		DTP	OPV		Dom zdravlja
12. mesec						MMR	Dom zdravlja
15. mesec	prva revakcinacija			DTP	OPV		Dom zdravlja
6-7 godina	druga revakcinacija			DTP	OPV	MMR	Dz u OŠ
12 godina			Hep B				Dz u OŠ
14 godina	treća revakcinacija			DT	OPV		Dz u OŠ

BCG - protiv tuberkuloze **Hep B** - protiv zarazne žutice B
OPV - protiv dječije paralize **DTP** - protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja
MMR - protiv malih boginja, zauški i rubeole **DT** - protiv difterije i tetanusa
HiB - protiv hemofilus influence tipa B

EFIKASNOST IMUNIZACIJE	
BCG	80%
Difterija	95%
HiB	95% - 100%
MMR	95%
Polio	99% (sa tri doze)
Tetanus	skoro 100%
Veliki kašalj	80% - 85%

DOB	VAKCINA	NAČIN DAVANJA
Po rođenju (12-24 h)	BCG i Hepatitis B	Interdermalno Intramuskularno
Sa navršenim 1 mjesecom	Hepatitis B	Intramuskularno
Sa navršena 2 mjeseca	Di-Te-Per, Polio, HiB	Intramuskularno Oralno Intramuskularno
U 4 mjesecu	Di-Te-Per, Polio, HiB	Intramuskularno Oralno Intramuskularno
Sa navršenih 6 mjeseci	Di-Te-Per, Polio, Hepatitis B	Intramuskularno Oralno Intramuskularno
U 13 mjesecu	MRP	Intramuskularno
U 18 mjesecu	Polio i HiB	Oralno Intramuskularno
U 5 godini života	Di-Te-Per, Polio	Intramuskularno Oralno
U 6 godini života	MRP	Intramuskularno
U 7 godini života	Za (0,1,6) Hepatitis B	Intramuskularno
U 14 godini života	Di-Te, Polio, Rubeola	Intramuskularno Oralno Intramuskularno
U 18 godini života	Ana-Te	Intramuskularno